

Enquête sur la prévalence de la consommation d'alcool pendant la grossesse à Genève

Judith Barasche, Valérie Graff et Julien Dupraz
Faculté de Médecine

Activités à option, 2e année



Méthodes

- Enquête par questionnaire dans l'unité de post-partum de la maternité
- Récolte des données 2 fois par semaine durant 5 semaines (janvier-février 2008)
- Questionnaires anonymes rendus dans une enveloppe vierge



Participantes

- 207 questionnaires récoltés
- Taux de consentement 96% (216/224)
- Taux de réponse 96% (207/216)


- Age moyen 31 ans
- Femmes d'origine suisse 34%
- Langue principale : français 73%



Participant

- Nombre moyen d'années d'enseignement suivies 14.5 ans
- Vivant en couple 93%
- Mariées 71%
- Activité rémunérée avant l'accouchement 78%
- Ayant d'autres enfants en moyenne 1.5

Prévalence consommation d'alcool





Prévalence et déterminants

- Pas d'association entre le fait d'avoir bu 1 verre d'alcool au moins durant la grossesse et :
 - Age
 - Pays d'origine (Suisse vs autre)
 - Langue principale (français vs autre)
 - Etat civil
 - Vivant en couple vs autre
 - Revenu du ménage
 - Durée de la scolarité



Prévalence et déterminants

- Ont bu 1 verre ou plus durant leur grossesse :


Activité rémunérée avant l'accouchement :

Oui : 41 %

Non : 23 %

($p=0.04$)

Fréquence de la consommation durant la grossesse (parmi les consommatrices)






Quantité

Parmi les 73 femmes qui ont consommé de l'alcool pendant leur grossesse :

- 85% ont bu moins d'un verre par semaine
- Consommation moyenne : 0.4 verre /sem.
- 10% (n=7) de femmes ont bu au moins une fois 4 verres lors de la même occasion


Influence de l'entourage

- Modification de la consommation du conjoint




Influence de l'entourage

- Une personne qui savait que vous étiez enceinte vous a-t-elle proposé de l'alcool ?




Influence de l'entourage

- Une personne qui savait que vous étiez enceinte vous a-t-elle proposé de l'alcool ? (association avec consommation pendant la grossesse)




Influence de l'entourage et culpabilité

- Encouragements à diminuer et sentiment de culpabilité lié à la consommation



Informations sur les risques

- 86% des femmes ont été informées sur les risques liés à la consommation d'alcool durant la grossesse





Risques perçus (question ouverte)

	Occurrences
■ Prob. développ. / malformations :	107
■ Retard mental, cerveau :	54
■ Petite taille, petit poids :	42
■ Prématurité :	37
■ « Pas bien », « mauvais » :	24
■ Dépendance du bébé :	18
■ Fausse couche :	18
■ Syndrome d'alcoolisme foetal :	1



Discussion

- Point fort de l'étude : taux de réponse
- Limites: petit échantillon, validité des réponses ?
- 7/207 ont bu 4+ verres en une fois : groupe à risque à détecter systématiquement ?
- Influence de la consommation du conjoint et de l'entourage
- 2/3 ont consommé de l'alcool avant leur grossesse
- 1/3 en ont bu durant leur grossesse

Comment diminuer encore cette proportion ?